

Cirugía de Pterigión (conjuntiva)

Es un tejido delgado y transparente que recubre la córnea por encima del iris. Puede comprometer ambos ojos.

Causas, incidencia y factores de riesgo

La causa se desconoce, pero es más común en personas que han tenido exposición a la luz solar o al viento en exceso, como en el caso de aquellas personas que trabajan al aire libre.

Entre los factores de riesgo se pueden mencionar la exposición en áreas soleadas, polvorientas, arenosas o de mucho viento. Los granjeros, los pescadores y las personas que habitan cerca del ecuador a menudo están afectados.

Síntomas

El síntoma principal de un pterigión es un área indolora de tejido blanquecino elevado, con vasos sanguíneos sobre el borde interno o externo de la córnea.

Signos y exámenes

El diagnóstico se confirma con un examen físico de los ojos y párpados y por lo general no se requieren exámenes especiales.

Tratamiento

No se requiere tratamiento, a menos que el pterigión comience a obstruir la visión, en cuyo caso se debe extirpar por medio de cirugía. Use anteojos protectores y sombrero de ala para evitar que la afección reaparezca.

Expectativas (pronóstico)

La mayoría de los pterigionos no causan problemas y no requieren tratamiento. Aunque si el pterigión afecta la córnea central, los resultados después de su extracción no son tan buenos.

